



İSG TÜRKİYE SINAV

ARALIK 2025

HER DÖNEM TÜM TÜRKİYE 1. lerinin TEK ADRESİ

İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR !

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
A-B-C
SINAVLARINDA Kİ
GELMİŞ-GEÇMİŞ
EN BÜYÜK BAŞARI !

T.C. Kimlik Numarası	Adı ve Soyadı	Cem ÖZBAY
Sertifika Alanı	B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı	
Sınav Tarihi	10 Aralık 2023	
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2024	

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI	
Doğru	Yanlış
48	2

SINAV PUANI VE BAŞARI SINISI	
Puan	Akademik Başarı
96.00000	B Sınıfı

TIKLAYARAK
İZLEYEBİLİRSİNİZ !

50 SORUDA
48 DOĞRU !




TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



B SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



A SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



DSP TÜRKİYE 1.Sİ



**İŞYERİ HEKİMİ
TÜRKİYE 2.Sİ**




**İŞYERİ HEKİMİ
TÜRKİYE 2.Sİ**



www.isgturkiyesinav.com

2023 MAYIS DÖNEMİ TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



B SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



A SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

A sınıfı İGU - MUHAMMED NURULLAH ACAR

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	ÖMER SOLAK
Sertifika Alanı	A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
45		5

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
90,00000	1	3.020

A sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
<https://www.youtube.com/watch?v=m6eiF54Djpo&t=1261s>

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	RECEP GÜÇLÜ
Sertifika Alanı	B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
45		5

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
90,00000	1	6.785

B sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
<https://www.youtube.com/watch?v=fq-4Qu2Sbx&t=6s>

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	NİMET KÖSE
Sertifika Alanı	C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
44		6

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
88,00000	1	13.673

C sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
https://www.youtube.com/watch?v=85qyps6cw_o



EPİDEMİYOLOJİ

Prevalans:

Prevalans, prevalans hızı veya prevalans oranı, belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde, çalışma kapsamında yer alan, belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip **tüm olguların oranıdır**.

İnsidans:

İnsidans, insidans hızı veya insidans oranı, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların **yeni olgularının sayısını ifade eder**. Epidemiyoloji ve birçok sosyal tıp biliminde sıklıkla kullanılır.

- İki insidans değerinin birbirine oranı **«rölatif risk»** olarak bilinir.
- İki insidans değerinin farkına **«atfedilen risk»** denir.
- Atfedilen risk değerinin maruziyetin olduğu gruptaki insidans değerine oranı da **«korunabilirlik hızı»** olarak adlandırılır.



AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUN

1-

..... :

belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısını ifade eder. Epidemiyoloji ve birçok sosyal tıp biliminde sıklıkla kullanılır.

..... :

Belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde, çalışma kapsamında yer alan, belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranıdır.

- İki insidans değerinin birbirine oranı «.....» olarak bilinir.
- İki insidans değerinin farkına «.....» denir.
- Atfedilen risk değerinin maruziyetin olduğu gruptaki insidans değerine oranı da «.....» olarak adlandırılır.



Epidemiyolojik Araştırma Türleri



A-Tanımlayıcı (deskriptif) araştırmalar

- Müdahale yok
- Kontrol grubu yok
- Kişi, yer, zaman tanımlaması var
(kimde, nerde, ne zaman sorularına yanıt arar)
- Ucuzdur
- Zaman kazandırır
- Nedene yönelik ip uçları elde edilebilir
- Sağlık hizmetlerinin planlanması ve önceliklerin saptanmasında katkı sağlar
- Analitik çalışmaların ilk adımıdır

KODLAMA: SERNARYO - TANIMLAMASI

B-Analitik arařtırmalar

Neden sonu iliřkisini ortaya koymaya alıřır, neden? Niin sorularına yanıt arar

- a. Kesitsel arařtırmalar
- b. Vaka - kontrol arařtırmaları
- c. Kohort arařtırmaları

C-Mdahale arařtırmaları(deneysel)

- a. Profilaktik nlemlere ynelik MA
- b. Teraptik nlemlere ynelik MA

ÖNEMLİ ARAŞTIRMALAR

Kesitsel araştırmalar

- Kısa sürede, düşük maliyetle toplumun sağlık düzeyi hakkında bilgiler elde edilir.
- Evrenin tamamıyla ya da uygun büyüklük ve bileşimde örneklerle çalışıldığında sonuçlar evrene genellenebilir.
- Veri kaynağı olarak kayıtlar, anketler, laboratuvar sonuçları kullanılabilir.

KODLAMA: SERNARYO – VERİLER, KAYITLAR, ÖRNEKLER

Vaka kontrol araştırmaları

- Vaka-kontrol araştırmalarının analizinde neden-sonuç ilişkisinin derecesi tahmini rölatif risk ile gösterilir.
- Nadir görülen ve etkenle karşılaşma ve etkilenme süresi uzun olan hastalıkların risk faktörlerinin araştırılmasında en uygun yöntemdir,
- Hafıza faktörü nedeni ile sonuçların güvenilirliği tam değildir,
- İnsidans hesaplanamaz,
- Az sayıda kişi ile yapılabilir

KODLAMA: SERNARYO - KARŞILAŞTIRMA

Kohort arařtırmaları

Henüz bir hastalıęa yakalanmamıř saęlam kiřilerden, belirli bir etkenle karřılařmıř ve karřılařmamıř grupların **zaman içinde** izlenmesi řeklinde yapılan arařtırma türüdür.

Kohort Türleri:

Prospektif alıřma: Önceden planlanır ve gelecekteki bir zaman diliminde gerekleřtirilir. Bu alıřmada, bireyler hastalıęa sahip deęildir, ancak farklı gruplarda ortaya ıkma sıklıęını gözlemlemek için belirli bir süre boyunca gözlemlenir.

Retrospektif alıřma: Bu tür bir alıřmada, belirli hastalıklar için risk faktörlerini belirlemek amacıyla mevcut veriler incelenir. Zamanda geriye gitmek ve eksik bilgileri toplamak mümkün olmadıęı için yorumlar sınırlıdır.

KODLAMA:	SERNARYO – ZAMAN İİNDE İZLEMEK
-----------------	---------------------------------

Müdahale araştırmaları(deneysel araştırmalar)

1.Müdahale araştırmaları

2.Hayvan deneyleri

a-Profilaktik önlemlere yönelik: Bir aşı, yöntem veya müdahalenin belirli bir hastalığı önleyip önlemediği, hastalık sıklığını nasıl değiştirdiğini tanımlamak için yapılır. Kızamık aşı uygulaması, yemeklik tuzlara iyot eklenmesi gibi)

b-Terapötik önlemlere yönelik: Bir ilaç veya tedavi prosedürünün belirli bir hastalığı olanlar arasında;
Semptomları azaltıp azaltmadığı
Tekrarları önleyip önlemediği
Hastalıktan ölüm riskini azaltıp azaltmadığını tanımlamak için yapılır.

KODLAMA:	SERNARYO – MÜDAHALE , (gıda takviyesi gibi)
-----------------	---



SORULAR ÜZERİNDE KONUYU ANLAYALIM

1-

Bir maden işletmesinde çalışmakta olan **1.500** kişide akciğer filmi ve solunum fonksiyon testi ile yapılan taramada, **45** kişide pnömokonyoz ile uyumlu bulgular elde ediliyor.

Buna göre, pnömokonyozun prevalansı yüzde kaçtır?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

CEVAP: B



2-

Bir işyerinde çalışanlarda yaşanan beslenme sorununu çözmek için çalışanlara beslenme eğitimi veriliyor ve gıda zenginleştirme çalışmaları kapsamında çalışanlara verilen ekmeklere vitamin B ve demir ilavesi yapılıyor. Daha sonra eğitim ve gıda zenginleştirme uygulamasının sonuçları değerlendiriliyor.

Bu durum, aşağıdaki epidemiyolojik araştırma türlerinden hangisiyle açıklanır?

- A) Kesitsel
- B) Tanımlayıcı
- C) Müdahale
- D) Vaka-kontrol
- E) Metodolojik

CEVAP:C



3-

Akciğer kanseri ve sigara içme arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla akciğer kanseri olan ve olmayan belirli sayıda kişi ile epidemiyolojik bir çalışma yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; akciğer kanserli bireylerde sigara içme öyküsü akciğer kanseri olmayan gruptakilere göre üç kat daha fazla bulunmuştur. Bu bulgu, akciğer kanseri ile sigara içme arasında bir ilişki olabileceği şeklinde yorumlanır.

Bu çalışmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kohort
- B) Vaka-kontrol
- C) Müdahale
- D) Kesitsel
- E) Retrospektif

CEVAP:B



4-

750 işçinin çalışmakta olduğu bir işyerinde bir yılda 15 tane iş kazası meydana geliyor.

Buna göre iş kazası sıklık hızı yüzde kaçtır?

- A) 1,5
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 15

CEVAP:B

• İş Kazası Sıklık Hızı: $\frac{\text{İş yerindeki iş kazası sayısı}}{\text{İş yerindeki toplam çalışma süresi}} \times k$

• İş Kazası Ağırlık Hızı: $\frac{\text{İş kazası nedeniyle olan toplam işgöremezlik süresi (saat)}}{\text{İş yerindeki toplam çalışma süresi}} \times k$

5-

Asbestli malzeme üretimi yapılan 500 kişinin çalıştığı bir işletmede, çalışanlar 10 yıl boyunca akciğer kanseri açısından izlenmiş ve bu süre içinde 4 işçide akciğer kanseri geliştiği saptanmıştır.

Bu işletmede akciğer kanserinin 10 yıllık insidans hızı binde kaçtır?

- A) 8
- B) 10
- C) 20
- D) 40
- E) 125

CEVAP:A



6-

Bir metal kesim ve satış fabrikasında çalışan işyeri hekimi, işe yeni alınacak 200 kişiyi muayene ediyor ve işitme yönünden sağlık sorunları olmadığını belirtiyor. Bu kişilerin bir bölümü metal kesimi, bir bölümü depo ve satışta görevlendiriliyor. Bir yıl boyunca çalışanları izleyen işyeri hekimi, yaptığı aralıklı kontrol muayenesi ve işitme testleri sonucunda başlangıçta sağlam olan 40 kişide işitme kaybı belirtiliyor. Bu çalışanların 30'unun kesim, 10'unun depo ve satış bölümünde çalıştığını saptıyor. Bu işyeri hekimi, metal kesim işinde çalışmanın depo ve satışta çalışmaya göre, daha riskli olduğu, **aşağıdaki epidemiyolojik araştırma türlerinden hangisiyle söyleyebilir?**

- A) Kohort
- B) Müdahale
- C) Deneysel
- D) Metodolojik
- E) Tanımlayıcı



CEVAP:A

7-

Bir otomotiv fabrikasında işyeri hekimi, periyodik muayenelerden sonra montaj işlerinde çalışanlarda karpal tünel sendromlu hasta sıklığının, taşıma ve depo bölümlerinde çalışanlara göre daha fazla olduğunu saptıyor.

Bu işyeri hekimi, aşağıdaki epidemiyolojik çalışma yöntemlerinden hangisiyle elde edilen ölçütlerle montaj bölümünün daha riskli olduğunu ortaya koyabilir?

- A) Tanımlayıcı
- B) Müdahale
- C) Deneysel
- D) Meta analiz
- E) Vaka-kontrol

CEVAP:E



7-

Aşağıdakilerden hangisi epidemiyolojinin iş sağlığı alanında kullanım amaçlarından biri değildir?

- A) Çalışanların genel sağlık sorunlarının değerlendirilmesi
- B) Nedensel ilişkilerin araştırılması
- C) Sağlığı geliştirici faktörlerin tanımlanması
- D) Koruyucu yöntemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi
- E) Kayıtların güvenliğinin sağlanması

CEVAP:E

8-

1.000 işçinin çalışmakta olduğu bir akümülatör fabrikasında yapılan tarama çalışmasında, 50'sinin ilk kez olmak üzere 200 kişinin kan kurşun düzeyi, izin verilen sınır değerin üzerinde bulunmuştur.

Bu işyerinde kurşun etkilenmesi prevalans hızı yüzde kaçtır?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20
- E) 25

CEVAP: D

9-

Tabloda, bir işyerinde akciğer kanseri ve sigara içme durumu konusunda yapılmış bir kohort çalışmasının verileri gösterilmiştir.

	Akciğer kanseri olan	Akciğer kanseri olmayan	TOPLAM
Sigara içen	50	950	1.000
Sigara içmeyen	10	990	1.000

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma riski içmeyenlerin beş katıdır.
- B) Sigara içme durumu ile akciğer kanserine yakalanma riski arasında ilişki yoktur.
- C) Sigara içen grupta akciğer kanseri insidans hızı % 0,5'tir
- D) Sigara içmeyen grupta akciğer kanseri insidans hızı %10'dur.
- E) Tüm kohort içerisinde akciğer kanseri olan kişi sayısı 50'dir.

CEVAP: A

10-

Bir işyerinde toza maruziyeti olan gruptakilerin akciğer kanserine yakalanma riskinin, toza maruziyeti olmayan gruptakilerin akciğer kanserine yakalanma riskine oranlanması sonucu elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Relatif risk
- B) Atfedilen risk
- C) Korunabilirlik hızı
- D) İnsidans hızı
- E) Standartlaştırılmış ölüm oranı



CEVAP: A

